



แบบบันทึกการเฝ้าระวังและการติดตามการใช้ยา High Alert Drugs โรงพยาบาลฟักท่า
Streptokinase injection 1.5 MIU

ชื่อ..... HN..... วันที่.....

อาการแรกเริ่ม.....

ขนาดยา.....

เวลาให้ยา.....

กลุ่มยา plasminogen activator complex

ข้อบ่งใช้ และ ขนาดยา

Myocardial infarction : IV infusion 1,500,000 IU in 60 min

ความคงตัว

หลังละลายยาแล้วควรใช้ทันที หรือ เก็บในตู้เย็นได้ นาน 24 ชั่วโมง หรือ อุณหภูมิไม่เกิน 25 OC ได้นาน 8 ชั่วโมง

ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์

พบมากที่สุด : เลือดออกบริเวณที่ฉีดยาและห้อยเลือด เลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้

เลือดออกในทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ เลือดกำเดาไหลและภาวะความดันโลหิตต่ำ

พบน้อย : เลือดออกในกะโหลกศีรษะ พบประมาณร้อยละ 0.3 ถึง 1

อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ : Fever, Bruising, rash, anemia, muscle pain, anaphylactic เป็นต้น

แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK)

ก่อนให้ยา SK

- () Monitor EKG , O2 sat () On O2 cannula 3LPM () Record V/S , N/S ทุก 15 นาที
 () ประเมิน Chest pain

ตารางบันทึกอาการก่อนให้ยา SK

วันที่/ เวลา	V/S			N/S			Chest Pain (Pain Score)	หมายเหตุ
	BP	P	R	E	V	M		

ขั้นตอนการให้ยา SK

1. ให้ยา Pre-med

1.1 ASA 300 mg 1 tab เคี้ยว หรือASA 81 mg 4 tabs เคี้ยวเวลา.....น.

1.2 Clopidogrel (Plavix)

If age ≤ 75 yr. : 300 mg (4 tabs) เวลา.....น.

If age > 75 yr. : 75 mg (1 tab) เวลา.....น.

1.3 Isordil (5) 1 tab SL (กรณีมีอาการเจ็บหน้าอกไม่ทุเลาให้ได้ทุก 5 นาที x 3 dose)

ไม่ให้กรณี BP Drop เวลา.....น.

1.4 Hydrocortisone 300 mg (3 ขวด) + NSS 10 ml V push เวลา.....น.

(Hydrocortisone 1 amp=100 mg ผสมด้วย NSS 2 ml)

1.5 CPM (10 mg) 1 amp IV เวลา.....น.

1.6 ยาอื่น ๆ ที่ได้รับ

.....

.....

.....

.....

