



แบบบันทึกการเฝ้าระวังและการติดตามการใช้ยา High Alert Drugs โรงพยาบาลฟักท่า
Adenosine injection (6 mg/2ml)

การติดตามการใช้ยา

วันที่										
เวลา	ทันที		30 วินาที		1 นาที		5 นาที		10 นาที	
BP (90/60-160/100 mmHg) ระบุ										
HR (60-120 ครั้ง/min) ระบุ										
RR (16-20 ครั้ง/min) ระบุ										
อาการไม่พึงประสงค์	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
ปวดหัว วิงเวียน เห็นแสงจ้า										
หน้าแดง (flushing)										
เหนื่อย หายใจลำบากแน่นหน้าอก										
ผู้บันทึก(แพทย์/พยาบาล/เภสัช)										

Critical point

**รายงานแพทย์เมื่อพบอาการไม่พึงประสงค์ vital และ sign ผิดปกติ; BP < 90/60 mmHg; HR < 60 ครั้ง/นาที; RR > 20 หรือหายใจหอบ
 หมายเหตุ : ทำเครื่องหมาย X เมื่อไม่มีอาการ ; √ กรณีพบอาการผิดปกติ ; - หากผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้

Monitor EKG (เพื่อดู AV block)

ข้อมูลทั่วไป			
Onset of action	Duration	T max	
Almost immediate	10 วินาที	Unknown	
<input type="checkbox"/> IV rapid push 6 mg ภายใน 1-3 วินาที ถ้าไม่ตอบสนองใน 2 นาที ให้ 12 mg อีก 2 ครั้ง <input type="checkbox"/> ให้มีพยาบาล 2 คน สำหรับบริหารยา <input type="checkbox"/> ใช้ 3-way โดยข้างหนึ่งต่อกับ syringe ยาอีกด้าน ต่อด้วย extension+syringe น้ำเกลือสำหรับ flush <input type="checkbox"/> ระวังการให้ยาในกลุ่ม asthma และ severe COPD เพราะอาจทำให้ severe bronchospasm <input type="checkbox"/> ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยมี high degree heart block, sinuatrial disease เพราะอาจเกิด sinus arrest			
การเตรียมยา			
<input type="checkbox"/> ก่อนให้ยาจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายราบ (ไม่หนุนหมอน) <input type="checkbox"/> ให้ยา 1 amp โดยการฉีด IV rapid push ภายใน 1-3 วินาทีโดยไม่ต้อง dilute ใช้ syringe ขนาดเล็กสุดเพื่อลดแรงเสียดทานขณะฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำขนาดใหญ่บริเวณข้อพับแขนขวาและ flush ด้วย NSS 20 ml ตามโดยทันทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่หัวใจเต็มที่ <input type="checkbox"/> หลังฉีดยา ยกแขนข้างที่ฉีดยาให้สูงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ที่หัวใจได้เต็มที่			

